

Triagem Bipolar (MDQ)

Neurodevelopmental Screening Report

6

/ 13

Score

50%

Percentage

Alguns Indicadores — Abaixo do Limiar

Result

Você relatou de 4 a 6 sintomas dos itens do MDQ. Isso está abaixo do limiar clínico de triagem de 7 itens positivos, mas indica algumas características que se sobrepõem aos

Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Alguma vez teve um período em que se sentia tão bem ou tão eufórico que as outras pessoas pensavam que você não era você mesmo, ou estava tão eufórico que se meteu em problemas? elevated_mood	Sim	1
2	Alguma vez teve um período em que estava tão irritável que gritava com as pessoas ou iniciava brigas ou discussões? irritability	Sim	1
3	Alguma vez teve um período em que se sentia muito mais confiante do que o habitual? grandiosity	Sim	1
4	Alguma vez teve um período em que dormia muito menos do que o habitual e não sentia falta do sono? reduced_sleep	Sim	1
5	Alguma vez teve um período em que falava muito mais ou mais rápido do que o habitual? talkativeness	Sim	1
6	Alguma vez teve um período em que os pensamentos corriam	Sim	1

#	Question	Your answer	Pts
	pela sua mente ou não conseguia acalmar a cabeça? racing_thoughts		
7	Alguma vez teve um período em que estava tão facilmente distraído que tinha dificuldade em se concentrar ou manter o foco? distractibility	Não	0
8	Alguma vez teve um período em que tinha muito mais energia do que o habitual? increased_energy	Sim	1
9	Alguma vez teve um período em que estava muito mais ativo ou fazia muito mais coisas do que o habitual? increased_activity	Sim	1
10	Alguma vez teve um período em que estava muito mais sociável ou extrovertido do que o habitual — por exemplo, telefonar para amigos no meio da noite? sociability	Não	0
11	Alguma vez teve um período em que estava muito mais interessado em sexo do que o habitual? libido	Sim	1
12	Alguma vez teve um período em que fez coisas incomuns para você, ou que outros poderiam ter achado excessivas, imprudentes ou arriscadas? risky_behavior	Sim	1
13	Alguma vez teve um período em que gastar dinheiro causou problemas a você ou à sua família? financial_impact	Sim	1

**AI Interpretation by Claude (Anthropic)**

claude-sonnet-4-20250514

Esta é uma prévia do relatório narrativo com IA que você recebe após completar o rastreio MDQ. O relatório

completo é gerado pela IA Claude com base no seu padrão específico de respostas em cada item, produzindo uma interpretação personalizada que vai muito além da pontuação bruta.

Sua pontuação de exemplo está no meio da distribuição, ou seja, cerca de metade dos respondentes obtém pontuação maior e a outra metade menor. É uma boa base para interpretar os limiares clínicos: uma pontuação nessa faixa não é mínima nem clinicamente elevada, e o significado depende muito do contexto.

Num relatório real, esta seção destacaria os dois ou três itens que você endossou com mais força e explicaria sua relevância clínica. Indicaria o ponto de corte validado deste instrumento, compararia seu perfil ao grupo de referência e discutiria as razões mais frequentes para uma pontuação no seu nível.

Seguem recomendações práticas: ajustes de estilo de vida apoiados por pesquisas, quando considerar uma avaliação profissional e qual especialista consultar. O relatório também lista a referência publicada do instrumento para que você ou seu clínico verifiquem a metodologia.

Este rastreio não é um diagnóstico. É um ponto de partida estruturado para uma conversa com um profissional qualificado.

Recommendations

Considere discutir essas experiências com um clínico geral ou profissional de saúde mental, especialmente se causaram sofrimento, afetaram relacionamentos, trabalho ou finanças, ou ocorrem em episódios distintos em vez de continuamente. Manter um diário de humor, sono e energia por várias semanas pode fornecer informações úteis para qualquer consulta.

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.