



Dépistage du risque de psychose (PQ-16)

Rapport de Dépistage Neurodéveloppemental

8

/ 16

Score

50%

Pourcentage

Consultation clinique recommandée

Résultat

Votre score atteint ou dépasse le seuil clinique (6 items positifs ou plus). Dans l'étude originale de Ising et al. (2012), ce seuil identifiait avec une bonne

Vos réponses

Chaque réponse a contribué à votre score.

| # | Question | Votre réponse | Pts |
|---|---|---------------|-----|
| 1 | Je ressens peu d'intérêt pour les choses que j'aimais auparavant. <input type="text" value="anhedonia"/> | Non | 0 |
| 2 | J'ai souvent l'impression de revivre des événements exactement comme ils se sont déjà produits. <input type="text" value="perceptual_dejavu"/> | Non | 0 |
| 3 | Il m'arrive de sentir ou goûter des choses que les autres ne perçoivent pas. <input type="text" value="perceptual_olfactory"/> | Non | 0 |
| 4 | J'entends souvent des sons inhabituels comme des claquements, des cliquetis, des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles. <input type="text" value="perceptual_auditory"/> | Non | 0 |
| 5 | Il m'est arrivé d'être confus quant au fait qu'une expérience était réelle ou imaginaire. <input type="text" value="reality_testing"/> | Non | 0 |



| # | Question | Votre réponse | Pts |
|----|--|---------------|-----|
| 6 | En regardant une personne ou mon propre reflet dans un miroir, j'ai vu le visage changer sous mes yeux. perceptual_visual | Non | 0 |
| 7 | Je deviens extrêmement anxieux lorsque je rencontre des gens pour la première fois. social_anxiety | Oui | 1 |
| 8 | J'ai vu des choses que les autres personnes ne semblent pas voir. perceptual_visual_hallu | Non | 0 |
| 9 | Mes pensées sont parfois si fortes que je peux presque les entendre. thought_distortion | Non | 0 |
| 10 | J'ai ressenti la présence de quelqu'un ou d'une force autour de moi, sans pouvoir voir personne. presence | Oui | 1 |
| 11 | Je sens que certaines parties de mon corps ont changé d'une certaine manière, ou fonctionnent différemment. body_perception | Non | 0 |
| 12 | On m'a dit, ou suggéré, que mon comportement était inhabituel ou bizarre. behavior_bizarre | Non | 0 |
| 13 | Je suis souvent distrait par des sons lointains dont je n'ai habituellement pas conscience. perceptual_distant_sounds | Non | 0 |
| 14 | J'ai entendu des choses que les autres ne peuvent pas entendre, comme des voix qui chuchotent ou parlent. auditory_voices | Non | 0 |
| 15 | J'ai souvent des difficultés à m'exprimer quand je parle aux autres, même si je sais ce que je veux dire. disorganized_speech | Non | 0 |

| # | Question | Votre réponse | Pts |
|---|--|---------------|-----|
| 1 | J'ai souvent l'impression que les autres m'en veulent. | Non | 0 |
| 6 | <input type="text" value="paranoid"/> | | |



Interprétation IA par Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Ceci est un aperçu du rapport narratif propulsé par IA que vous recevez après avoir complété le dépistage PQ16. Le rapport complet est généré par Claude IA à partir de votre profil de réponses sur chaque item, produisant une interprétation personnalisée qui dépasse largement le score brut.

Votre score d'exemple se situe au milieu de la distribution, ce qui signifie qu'environ la moitié des répondants obtiennent un score plus élevé et l'autre moitié un score plus bas. C'est une bonne base pour interpréter les seuils cliniques : un score dans cette zone n'est ni minimal ni cliniquement élevé, et la signification dépend fortement du contexte.

Dans un vrai rapport, cette section mettrait en avant les deux ou trois items que vous avez le plus fortement endossés et expliquerait leur pertinence clinique. Elle préciserait le seuil validé pour cet instrument, comparerait votre profil au groupe de référence et discuterait les raisons les plus fréquentes d'obtenir un score à votre niveau.

Des recommandations pratiques suivent : ajustements de mode de vie appuyés par la recherche, quand envisager une évaluation professionnelle et quel spécialiste consulter. Le rapport indique aussi la référence publiée de l'instrument pour que vous ou votre clinicien puissiez vérifier la méthodologie.

Ce dépistage n'est pas un diagnostic. C'est un point de départ structuré pour une conversation avec un professionnel qualifié.

Recommandations

Prenez rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue clinicien dès que possible. Apportez ce résultat. Une évaluation et un accompagnement précoces améliorent considérablement le pronostic de toute pathologie du spectre psychotique - et la majorité des personnes positives à ce dépistage ne développent en réalité pas de trouble. Si vous vous sentez en crise, vous avez des pensées suicidaires ou ne vous sentez pas en sécurité, contactez immédiatement les urgences (15 en France, 112 en Europe).



Date : April 23, 2026

Sophie Martin

ID: 733D0757

Avis Important

Ce rapport est uniquement un outil de dépistage et ne constitue pas un diagnostic médical ou psychologique.

Ce test ne remplace pas une évaluation professionnelle. Pour un diagnostic fiable, consultez un neuropsychologue, un psychiatre ou un professionnel de santé qualifié.