

Rastreo do risco de psicose (PQ-16)

Neurodevelopmental Screening Report

8

/ 16

Score

50%

Percentage

Recomenda-se consulta clínica

Result

Sua pontuação atinge ou ultrapassa o ponto de corte clínico (6 ou mais itens positivos). No estudo original de Ising et al. (2012), esse limiar identificou com boa sensibilidade e

Your Responses

Each answer contributed to your score.

#	Question	Your answer	Pts
1	Sinto pouco interesse pelas coisas que costumava gostar. <input type="text" value="anhedonia"/>	Não	0
2	Frequentemente parece que estou revivendo eventos exatamente como aconteceram antes. <input type="text" value="perceptual_dejavu"/>	Não	0
3	Às vezes sinto cheiros ou sabores que outras pessoas não conseguem perceber. <input type="text" value="perceptual_olfactory"/>	Não	0
4	Frequentemente ouço sons incomuns como pancadas, cliques, assobios, palmas ou zumbidos nos ouvidos. <input type="text" value="perceptual_auditory"/>	Não	0
5	Já fiquei confuso sobre se algo que vivi era real ou imaginário. <input type="text" value="reality_testing"/>	Não	0
6	Ao olhar para uma pessoa ou para mim mesmo no espelho, vi o rosto mudar diante dos meus olhos. <input type="text" value="perceptual_visual"/>	Não	0

#	Question	Your answer	Pts
7	Fico extremamente ansioso quando conheço pessoas pela primeira vez. social_anxiety	Sim	1
8	Já vi coisas que outras pessoas aparentemente não conseguem ver. perceptual_visual_hallu	Não	0
9	Meus pensamentos às vezes são tão fortes que quase consigo ouvi-los. thought_distortion	Não	0
10	Já senti que alguma pessoa ou força estava ao meu redor, mesmo sem ver ninguém. presence	Sim	1
11	Sinto que partes do meu corpo mudaram de alguma forma, ou funcionam de modo diferente. body_perception	Não	0
12	Já me disseram, ou sugeriram, que meu comportamento é incomum ou estranho. behavior_bizarre	Não	0
13	Frequentemente sou distraído por sons distantes dos quais normalmente não tenho consciência. perceptual_distant_sounds	Não	0
14	Já ouvi coisas que outras pessoas não conseguem ouvir, como vozes de pessoas sussurrando ou falando. auditory_voices	Não	0
15	Frequentemente tenho dificuldade em me expressar ao falar com outros, mesmo sabendo o que quero dizer. disorganized_speech	Não	0
16	Frequentemente sinto que os outros estão contra mim. paranoid	Não	0



AI Interpretation by Claude (Anthropic)

claude-sonnet-4-20250514

Esta é uma prévia do relatório narrativo com IA que você recebe após completar o rastreio PQ16. O relatório completo é gerado pela IA Claude com base no seu padrão específico de respostas em cada item, produzindo uma interpretação personalizada que vai muito além da pontuação bruta.

Sua pontuação de exemplo está no meio da distribuição, ou seja, cerca de metade dos respondentes obtém pontuação maior e a outra metade menor. É uma boa base para interpretar os limiares clínicos: uma pontuação nessa faixa não é mínima nem clinicamente elevada, e o significado depende muito do contexto.

Num relatório real, esta seção destacaria os dois ou três itens que você endossou com mais força e explicaria sua relevância clínica. Indicaria o ponto de corte validado deste instrumento, compararia seu perfil ao grupo de referência e discutiria as razões mais frequentes para uma pontuação no seu nível.

Seguem recomendações práticas: ajustes de estilo de vida apoiados por pesquisas, quando considerar uma avaliação profissional e qual especialista consultar. O relatório também lista a referência publicada do instrumento para que você ou seu clínico verifiquem a metodologia.

Este rastreio não é um diagnóstico. É um ponto de partida estruturado para uma conversa com um profissional qualificado.

Recommendations

Agende uma consulta com um psiquiatra ou um psicólogo clínico o quanto antes. Leve este resultado consigo. Avaliação e apoio precoces melhoram significativamente o prognóstico de qualquer transtorno do espectro psicótico - e a maioria das pessoas com rastreio positivo NÃO desenvolve de fato um transtorno. Se você se sentir em crise, tiver pensamentos suicidas ou não se sentir seguro, contate imediatamente os serviços de emergência (192 BR, 112 PT).

Important Notice

This report is a screening tool only and does not constitute a medical or psychological diagnosis.

This test does not replace a professional evaluation. For a reliable diagnosis, please consult a neuropsychologist, psychiatrist, or qualified healthcare professional.